



檢查後， 我該注意什麼？

血腫及感染是最常見的併發症，術後傷口建議保持乾燥。切片檢查及手術導致癌細胞經針徑散播的機率非常低，任何檢查存在偽陽性或偽陰性的可能，仍需要配合臨床觸診和影像學檢查做綜合判斷，而切片手術仍是安全且是乳癌最後確診的重要步驟！



乳房檢查有異常 一定要切片嗎？



傷口照護

保持乾燥

加壓止血



新竹國泰綜合醫院

Hsinchu Cathay General Hospital




新竹市中華路二段678號




03-5278999



為您的健康把關 😊



接下來 我能選擇?



1 粗針穿刺檢查(Core needle biopsy)

粗針穿刺檢查是以14~20 號粗針頭，配合自動彈射切片取得組織，於施打局部麻醉後開始進行，經由同一針孔，取樣至少4 次，以取得足夠組織進一步化驗。過程並非將整個病灶移除，而是取局部組織化驗，故術後傷口約為針孔大小，較不會有疤痕。


2 真空輔助乳房切片系統

真空輔助乳房切片系統是利用超音波、乳房攝影或核磁共振攝影等方式做指引，於乳房行局部麻醉後，將真空輔助乳房切片系統的切片針插入病灶，以取得組織化驗，相較於傳統外科切片手術，傷口較小，沒有明顯的疤痕，且能避免乳房外觀凹陷。

3 外科手術切片 (Excisional Biopsy)

外科手術切片是在臨床上或影像上懷疑腫塊為惡性，但細針抽吸或粗針組織切片，都無法獲得證實或無法執行時，才會由外科醫師經由手術的方式，將腫塊或疑似異常的部位盡可能做完整切除，以取得組織進行病理檢驗，了解組織的屬性。

發現乳房異常且必須接受切片檢查或手術時，多數人總是感到惶恐不安，而最擔心的問題不外乎是檢查是否需要麻醉?過程會疼痛嗎?乳房外觀會不會變形?診斷過程如何進行等，整體的不安全感，甚至可能因此拒絕檢查。建議應適時與醫療團隊討論，避免延誤診斷及治療的黃金時間。



當發現乳房有異常變化時，需靠臨床影像學如:乳房攝影、3D乳房X光攝影、乳房超音波、乳房核磁共振及相關理學檢查進一步鑑別診斷，而如有其他異常發現，則需要進行進一步分辨良性或惡性，這時就須經由切片檢查確認病灶。



別慌張，一步一步來