

# HPV疫苗 可預防子宮頸癌！

HPV疫苗知多少





# 什麼是 HPV ?

人類乳突病毒  
(Human Papillomavirus, 簡稱 HPV)  
是一種會導致癌化的 DNA 病毒



主要傳染途徑 性行為



高危險型

子宮頸癌超過70%  
由高危險型的HPV  
第16、18型引起




病變

- ✦ 子宮頸癌前病變
- ✦ 子宮頸癌
- ✦ 男女外生殖器癌

# 誰容易感染 HPV？

目前研究資料顯示，不論男女，每個人一生中約有**5-8成**的機會感染到HPV。女性開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加。此外，伴侶性經驗較複雜、長期免疫力低落等情況，均可能增加HPV的感染風險。





# HPV 疫苗可預防子宮頸癌



HPV疫苗為不活化疫苗，  
可誘發人體免疫反應產生抗體，  
預防**7成**子宮頸癌發生

⚠ 提醒您！疫苗未涵蓋所有病毒型別

抗原 **10**人中有**7**人受保護



# HPV 疫苗知多少？

**疫苗保護力** 目前我國食品藥物管理署已核准3種HPV疫苗上市，不論施打那**1**種疫苗，皆可預防最重要的第**16**型及第**18**型引起的子宮頸癌，保護力約**10**年

**疫苗價位** 每劑疫苗市價約**3000-6000**元

**疫苗補助** 政府有提供公費施打對象，非補助對象或不想施打公費補助疫苗，可選擇至有提供HPV疫苗接種的醫療院所自費接種





# 接種注意事項

## 接種前



- 1 了解HPV疫苗
- 2 決定是否接種(同意者填寫同意書)

## 接種時



- 1 主動告知病史或特殊狀況
- 2 量體溫
- 3 醫師評估是否接種

## 接種後



- 1 現場休息**30**分鐘再離開
- 2 現場若有不良反應，通知醫療人員處理
- 3 離開後若有不良反應撥打服務專線


**0800-88-3513**  
(寶貝，守護一生)諮詢

# 哪些人不建議接種 HPV 疫苗？

下列情況不建議接種



接種**HPV**疫苗後  
出現過敏症狀者



懷孕者



有計畫懷孕者



特殊疾病史者

接種當天有發燒或感染症狀、正在服藥等情形，應主動告知醫師以進行評估

# 接種 HPV 疫苗的副作用？

常見副作用：



暈針、發燒、頭痛、噁心



注射部位疼痛  
腫脹、紅斑、搔癢



掃我查詢疫苗仿單資訊

★ 接種後應觀察30分鐘再離開



# 發生副作用或不良反應怎麼辦？



- ➡ 前往醫療機構就醫，並告知醫師疫苗接種史
- ➡ 撥打服務專線 **0800-88-3513**(寶貝，守護一生)諮詢
- ➡ 撥打各地方政府衛生局HPV疫苗諮詢電話
- ➡ 撥打食品藥物管理署不良反應通報中心電話



# 自己的健康自己顧！

預防子宮頸癌，三道防線缺一不可！



**1** 安全性行為



**2** 接種**HPV**疫苗



**3** 定期做子宮頸抹片篩檢

三道防護完整保護 子宮頸癌不上身

更多資訊請上  
**HPV**疫苗專欄

