




患者應該如何避免散播傳染及再復發？

- 一、內衣褲應每天換洗。
- 二、蟲卵對陽光敏感，故白天可開窗曝曬室內殺死蟲卵。
- 三、注意個人衛生，飯前、便後洗手及時常修剪指甲。
- 四、避免咬指甲和抓肛門的動作，以降低重複感染的機會。



衛生署疾病管制局 關心您
 疫情通報專線1922
 全球資訊網 www.cdc.gov.tw

蟯蟲症



雌蟲

雄蟲

蟲卵





什麼是蟯蟲？

蟯蟲是一種小而白色的腸道寄生蟲，又叫針狀蟲。雄性成蟲長約2~5mm，雌性成蟲長約8~13mm。



蟯蟲症的症狀是什麼？

大多數的人症狀不明顯，最常出現的症狀是肛門搔癢。



哪些人是蟯蟲症的危險群？

好發族群為學齡前幼兒及學童，如家庭小孩人數愈多或環境愈擁擠時，其家人感染率也愈高。



蟯蟲症如何傳播？

可經由污染的飲食、物品或手指等食入蟲卵，或吸入附著在空氣灰塵中的蟲卵而感染。



蟯蟲症如何預防？

- 一、勤洗手（飯前、便後洗手）。
- 二、經常修剪指甲，避免藏納污垢。
- 三、儘量避免在地上玩耍。
- 四、儘量避免咬指甲或抓肛門動作。



蟯蟲症如何診斷？

幼童如有肛門搔癢，可以使用膠紙肛圍擦拭法檢查蟲卵，有時也可直接在患者的床上或肛門周圍發現成蟲。如以膠紙檢查，通常於早上一起床即做。



蟯蟲症如何治療？

治療通常需要二次療程，第一次治療殺死成蟲，但可能殘存蟲卵，故在二週後需再投藥一次，同住的家庭人通常也需要治療。

