


SD / 出現疑似症狀 該怎麼辦

從流行地區返國21天內，如出現發燒、嘔吐、腹瀉、皮膚出疹等不舒服症狀，請先撥打1922防疫專線協助就醫(或0800-001922)，並主動告知旅遊史及接觸史，千萬不要自行就醫。



21
DAYS



SD / 預防方法

伊波拉病毒目前尚無有效疫苗可供預防接種。其他預防方式包括：



1. 避免前往西非等流行地區。

2. 如必須前往流行地區，避免接觸或食用果蝠、猿猴等野生動物；食用肉類前應煮熟。



3. 在流行地區避免至醫院探視或接觸病人。

4. 注意個人衛生，落實勤洗手及咳嗽戴口罩等。



認識

伊波拉



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人

疫情通報及關懷專線：1922



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

伊波拉 小檔案

伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病，其初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛與咽喉痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。透過接觸受感染動物、感染者或其屍體之血液或體液而感染。病人於潛伏期(2-21天)不具傳染力，出現症狀後才具傳染力。


潛伏期

2~21天，平均為4~10天。


另男性病患於康復後3個月內，精液仍可能帶有病毒，故男性病患於這段時間應避免性行為，或使用保險套。

傳染途徑

透過接觸傳染，此病毒可直接由動物傳染給人。如接觸到受感染動物的血液、分泌物等，或是透過中間宿主之野生動物，例如受感染的猴、猿等再傳染給人。



人與人之間的傳染，是因直接接觸到被感染者或其屍體之血液、分泌物、器官、精液等；或是間接接觸被感染者體液污染的環境(如衣服、床單或針頭等)而感染。目前尚未有藉由空氣微粒傳播的案例。



發病症狀

初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。



重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。個案致死率可高達9成。