



因為有你／妳 社會美好…

環境衛生的改善和醫藥的發達，我們免去了許多傳染病的威脅，
從前在小學班級裡總會發現幾個有砂眼或是頭蝨小朋友，
現在只在很少地區出現，但是人類的生活卻從未免於疾病的威脅。

每年初夏腸病毒常困擾小朋友，或造成幼稚園停課；

在南台灣，登革熱的威脅也常年存在；

而像肺結核、流行性感胃這樣古老的疾病則不斷以變種來維繫傳染的發生……。

愛滋病毒已形成燎原的趨勢

病毒對人類的威脅不可能消失，


但，卻可以透過衛生教育，培養正確的防疫知能，

以面對未來更多不可知的疾病威脅。

防疫・健康，讓衛生教育紮根社區鄰里是本基金會的工作目標，
如果您也認同我們，歡迎您親身加入我們或給予我們經費的協助，

讓我們能夠持續發揚歐巴尼醫師無私奉獻的精神。

歐巴尼醫師是全球首位發現SARS疫情的醫師，
但卻在協助救播過程感染SARS犧牲……



防疫 健康 人道關懷

財團法人歐巴尼紀念基金會

www.urbani.org.tw

台北市基隆路一段163號11樓之2

TEL3765-3673 FAX3765-3675

郵政劃撥帳號 19819629

夏日殺手，揮之不去的惡毒！！

—ENTEROVIRUS71

爸爸媽媽心中最擔心的腸病毒



防疫 健康 人道關懷



Contents



防疫 健康 人道關懷

4	認識腸病毒，腸病毒不只一種
6	傳染途徑
9	臨床症狀
12	治療與照護
13	預防方法
15	Q&A
16	寶寶健康食譜
18	防疫健康操
20	發燒怎麼辦？
24	腹瀉怎麼辦？
26	嬰幼兒常見疾病的症狀及處理方法
27	寶寶健康備忘錄
28	各大醫院一覽表
32	附錄

發行人／李明亮

總編輯／許國雄

發行機構／財團法人歐巴尼紀念基金會

地址／台北市基隆路一段163號11樓之2

電話／02-3765-3673

傳真／02-3765-3675

郵政劃撥／19819629

網址／<http://www.urbani.org.tw>

發行年月／中華民國94年5月

出版／三刷(65,000本)

執行編輯／黃秋碧

健康促進指導老師／趙叔碧

美術設計／陳麗秋

繪圖／姜春年

印刷／盛新印刷事業有限公司


工本費25元

ISBN：9572935313

夏日殺手，揮之不去的惡毒 !!

—ENTEROVIRUS71

爸爸媽媽心中最擔心的腸病毒



每年夏秋之初常為國內腸病毒感染症（手口足症）的流行期，由於嬰幼童（尤其三歲以下）感染腸病毒後，有些會併發腦炎、類小兒麻痺症候群、心肌炎或肺水腫等嚴重症狀，而且病童病程發展也相當迅速，可能導致廣泛性的中樞神經傷害及後遺症，甚至死亡。

因此每到了腸病毒流行季節，托兒所、幼稚園傳來停課



的消息，許多父母、師長總不免要一陣恐慌，周遭一有病例，難免對著微有異樣的孩子張開嘴檢查，喉嚨裡有沒有長水泡？手心、腳掌呢？有沒有異樣？究竟腸病毒是一種什麼樣的病毒？腸病毒感染是小孩專屬的病嗎？如果不小心感染了腸病毒，會出現什麼症狀？又該如何給予妥善照顧？

認識腸病毒，腸病毒不只一種

腸病毒是一種微小的RNA病毒（濾過性病毒），大小約20-30nm，腸病毒是一群病毒的總稱，而不只是一種病毒。事實上依照血清來分類，腸病毒至少就可分出66種，一般我們常見的腸病毒有：會造成小兒麻痺的小兒麻痺病毒（3型）、克沙奇A型（23型）、B型（6型）、伊科病毒（32型）、腸病毒68-71型等等，其中除了小兒麻痺病毒外，其餘病毒目前沒有疫苗可以預防。由於腸病毒的型別很多，且免疫反應期程不一，因此得過腸病毒往往不會就終生免疫，還是有再次感染的機會。

腸病毒雖名為腸病毒，但僅手口足症與咽峽炎會出現腸道症狀，它其實是一種夏天時，或幼兒聚集處常見的發燒性疾病，初期症狀有如感冒，這年年都傳出的疾病，由於型別眾多，原本不太引起老師、家長的恐慌，不過，民國87年時，腸病毒重症71型在台灣肆虐，並且造成高達78名兒童喪命，引起社會高度關注與媒體大肆報導，從此腸病毒彷彿成為師長及年輕的父母每逢夏日的一場惱人惡夢。

不只在台灣有腸病毒疫情，腸病毒存在世界各地，台灣因位處亞熱帶，幾乎全年都可能有感染發生，但仍以初夏或秋初常有流行高峰出現。



防疫 健康 人道關懷



傳染途徑

腸病毒是怎麼傳染的呢？在哪裡容易散播？腸病毒是由病患的口鼻分泌物或皮膚上潰瘍的水泡、糞便排出後，再經由接觸或飛沫方式傳染別人，「糞一口傳染」也是常見的傳染方式。傳染管道可能是腸胃道系統或呼吸道系統，病毒可能經由呼吸道的口水飛沫傳染和胃腸道的糞口傳染，像是接觸到病人的口水、鼻涕、痰及皮膚上潰瘍的水泡、甚至只要不小心從嘴巴吃進任何被污染的食物和水，吸入腸病毒患者咳嗽時噴出來的飛沫，都有可能因此受到感染。

病人的病毒量什麼時候最多呢？在病人出現症狀前2-3，天到症狀一出現後的1-2星期都可能從病人的呼





防疫 健康 人道關懷



夏日殺手，揮之不去的惡毒 !!

—ENTEROVIRUS71

爸爸媽媽心中最擔心的腸病毒

吸道、口腔分泌物及腸道糞便排出大量病毒傳染別人，甚至這頑強病毒在人的腸道中，可以存在數週之久，還具有傳染的威力，衛生不好、不乾淨的飲用水、食物都可能造成腸病毒的流行。

一般說來，病人在發病後1星期傳染力最高，病程約7-10日，因此家中若有人感染腸病毒，就應該採取區隔或必要的防護措施，以免再傳染給年紀更小的孩童、嬰幼兒，同時也應該暫時避免上學，留在家中休養，防止疫情擴散。

腸病毒容易在哪裡散播呢？顯然就是人潮密集的公共場所囉！例如：學校、醫院、百貨公司、遊樂場、游泳池……及衛生環境不佳的地方，由於人類可說是腸病毒唯一的宿主，因此阻絕病毒最佳的方法，除增加對安全瞭解防範外，無非就是加強個人衛生習慣及生活環境的清潔與消毒工作了。

值得注意的事，腸病毒無症狀的隱性感可達1個月，絕大多數的成人感染腸病毒並不會出現症狀，根據小兒科醫師臨床經驗發現，許多時候家裡的嬰幼兒會感染腸病毒，多半就是成人把病毒從外面帶回家裡的，再經由親密摟抱接觸或以飛沫方式傳染幼兒。





臨床症狀

不同的腸病毒型別，病毒喜歡侵犯的部位也不盡相同，因此造成各式各類的疾病與症狀。輕者可能出現感冒症狀、咽喉炎、口腔潰瘍，重者像是克沙奇病毒A型喜歡侵襲皮膚及黏膜，克沙奇病毒B型，則可引起心臟、肋膜、肺臟、肝臟等等器官的病變，還有一些其他的型別可能會侵犯腦膜、運動神經及腦細胞，造成無菌性腦膜炎、麻痺現象及腦炎，這麼多的症狀與疾病，是不是已經讓身為家長的您頭昏眼花，感到驚恐不已？

如果家裡的幼兒得了腸病毒該怎麼辦？根據臨床醫師的追蹤發現，大多數兒童感染腸病毒，並不一定會出現臨床症狀，就是有症狀，症狀多半輕微，而最常見的症狀是發燒，特別是在夏秋之際，兒童的發燒有可能就是腸病毒所引起的。

不過，一旦家裡的幼兒開始出現持續高燒、嘔吐、嗜睡、不安、意識不清、活力不佳、咳嗽、呼吸急促等，又出現了典型的手、口、足部水泡，那麼這時候我們幾乎可以確定，就是感染腸病毒。

腸病毒的潛伏期有多久呢？一般是3-5天。如果孩子的學校裡，同一個班級，有2位同學以上確定感染腸病毒，根據縣市教育局的規定，該班級必須停課至少1週，班級裡的學童身體的狀況與變化都應該加以追蹤觀察，因為停課而返家休息的學童，家長應該細心觀察孩子是

夏日殺手，揮之不去的惡毒 !!

—ENTEROVIRUS71

爸爸媽媽心中最擔心的腸病毒





否出現合併發燒、口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍等等最典型的腸病毒症狀，及早發現，儘速就醫。一般來說腸病毒的病程大約7-10天左右，只要病童獲得充分休息與適當醫療照護就可以痊癒。

不過，當然也有少數較嚴重的病童可能會出現併發無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等等併發症，這種情況特別是新生兒及小嬰兒感染腸病毒更應該小心注意，嬰幼兒感染腸病毒偶而會有併發休克，侵犯到身體其他器官的情況，而造成死亡，這也是腸病毒為什麼令家長擔憂害怕的原因。

一旦經醫師診斷出感染腸病毒，家長應配合醫師叮嚀密切注意觀察病童（尤其三歲以下嬰幼童更應該特別觀察）孩子是否出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，例如：有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（類似受到驚嚇的突發性全身肌肉收縮動作）、持續嘔吐、持續發燒、煩躁

不安、昏迷、頸部僵硬、肢體麻痺、抽搐、呼吸急促、心跳加快或心律不整等疑似重症症狀時，這時請務必要立即就醫，儘速接受治療，以免錯過治療的黃金時間喔！



夏日殺手，揮之不去的惡毒 !!

—ENTEROVIRUS71

爸爸媽媽心中最擔心的腸病毒



治療與照護

很可惜的是，目前還沒有特效藥物可以改善腸病毒，只能採取支持療法，來改善病童的症狀，家長在照顧孩子時，應確實依照醫師的叮嚀留意水分的供給與營養補給，並且讓孩子充分休息。

病童如果因為咽喉痛無法進食，也可以鼓勵病童飲用冰涼的飲料或食物像是小朋友最愛的冰淇淋、冰棒、布丁都是很好的替代品，以補充水份。如果已經有脫水現象，則需給予靜脈點滴注射。但如果已產生嚴重併發症，則需依病變部位採取特殊療法。

此外在處理病童的分泌物與排泄物時（口水、鼻涕、糞便），應該小心處理，處理完畢立即洗手。



預防方法

因為腸病毒是經由口、飛沫、接觸傳染，疫情控制不易，只能採取預防性的措施。以下歸納流行期間生活保健10Tips：

1. 流行期間應避免攜帶幼兒出入人潮擁擠、空氣不流通之公共場所。
2. 不要與疑似病患接觸。
3. 自外返家先洗手，漱口及更衣後，才摟抱、親吻小孩，餵食小孩前，務必正確洗手，避免將病毒傳染給嬰幼童。
4. 加強個人衛生，指甲要剪短，常以肥皂洗手。





正確洗手5步驟：

濕—在水龍頭下把手淋濕。

搓—擦上肥皂或洗手液，雙手搓揉起泡
20秒。

沖—用清水將雙手洗淨。

捧—捧水將水龍頭清洗乾淨。

擦—用擦手紙、乾淨的毛巾或手帕將手
擦乾淨。

5. 兒童玩具（尤其是帶毛玩具）要常清洗保持潔淨，避免幼童將玩具放入口中咬弄。

6. 加強居家環境衛生與通風。

7. 注意營養、均衡飲食、保持適當運動及充足睡眠，以增強個人的免疫力。

8. 家中如有病患應及早就醫，即使症狀很輕微，也應該留在家裡休息，並依醫師叮嚀處理，才能儘速回復健康，以免傳染他人。

9. 根據各縣市教育局規定每班若有超過二位以上幼兒確定感染腸病毒，必須停課至少1週，全所進行全面消毒工作。

10. 時時注意病童狀況，並與就診醫師保持聯絡。



Q&A

每年夏秋之際，腸病毒就令家長擔憂頭痛、煩惱不已，儘管相關資訊已經很完善，但是由於攸關小寶貝的健康問題，爸爸媽媽們免不了東操心、西擔心，腦子裡還是冒出許多疑問，就深怕自己的小寶貝一個不小心被傳染了，然而全面禁止孩子的戶外活動，又似乎有點矯枉過正，以下整理幾個爸媽心中可能的疑惑，提供參考：

Q：流行期可以帶孩子去游泳嗎？

A：游泳池的確有可能成為傳染的途徑，但是池水中添加的氯對腸病毒仍具有抑制的作用，只要不是在腸病毒流行的高峰期，家長無需太過緊張，還是可以讓孩子到良好管理、有定期消毒的游泳池去運動玩水。

Q：腸病毒流行時，不帶寶寶到外面，是否就不會被傳染？

A：寶寶雖然待在家中，但是家中其他成員仍然會進出家門，這樣便足以將外界有害的病毒轉介帶回家，傳染給寶寶，因此成員應該要有良好的衛生習慣。

Q：在家噴灑藥劑滅蟲，是否可以減少感染的機會？

A：腸病毒並不是由昆蟲等病媒傳播，因此噴灑殺蟲劑對於腸病毒，可是沒啥用的囉，最重要的還是加強個人衛生，常洗手，還有保持環境的通風與衛生就可以了。

Q：感染過腸病毒痊癒之後，是不是具有免疫力？以後會不會復發？

A：受到某一種腸病毒感染以後，人體會產生免疫力，所以對於同一種病毒而言，復發機率很低。但是腸病毒至少有66種以上型別，而有好幾種腸病毒型別會引起同樣的手足口病或疱疹性咽峽炎，所以感染過腸病毒的小朋友還是有機會被另一種腸病毒感染而出現症狀。

夏日殺手，揮之不去的惡毒 !!

—ENTEROVIRUS71


爸爸媽媽心中最擔心的腸病毒

寶寶健康食譜

家中有幼兒的父母，莫不希望能有有效的預防措施或治療方法，讓孩子遠離腸病毒的威脅，以下為幼兒設計了簡單保健食譜及運動，對於孩子免疫力的提升，有不錯的效果喔 !!

適度飲用寡糖飲料加優酪乳

沒錯！沒錯！沒事多喝寡糖飲料加優酪乳，來增加人體腸道內正常菌叢的孳生，成為最優的細菌，使害菌無法生存，也可減少病毒感染、防禦腸病毒入侵喔！除了好喝的優酪乳之外，多吃富含纖維的食品，如：穀類、豆、芋薯、蔬果、海藻等，有助於腸道清理、免疫力提升有不錯的效果。





山藥粥

- 材料 山藥1斤
- 煮法 1.將山藥放入適量之水中煮熟，加入適量調味料即可。亦可加入排骨（或瘦肉片）共煮。
2.幼兒者，可將煮熟之山藥粥磨成泥狀餵食。
- 服法 每日一餐，可作為主食。
- 功效 健脾胃，提升免疫力。

四神湯

- 材料 薏苡仁1兩、芡實1兩、山藥1兩、蓮子1兩。
- 煮法 將藥材加入適量之水煮熟，放入適量調味料即可，可隨個人喜好加入排骨、小腸（或瘦肉片）等。
- 功效 健脾胃清熱利溼，提升免疫力。



夏日殺手，揮之不去的惡毒 !!

— ENTEROVIRUS71

爸爸媽媽心中最擔心的腸病毒

防疫健康操

示範者 / 趙叔碧 老師

傅柏恩 小朋友



動作一（連續動作）

1. 雙手握拳伸直
2. 雙手來回開併數次



動作二（連續動作）

1. 雙手肘彎曲，手肘互碰。（盡可能抬高）
2. 雙手肘用力向左右兩側撐開。



動作三

1. 右手肘盡量靠近腰，左手伸直，身體側彎
2. 換邊換手（左手肘盡量靠近腰，右手伸直，身體側彎）



動作四

1. 雙手掌交叉重疊立掌，臂膀用力往前推



（立掌正面圖）

發燒怎麼辦？

(資料來源／行政院衛生署)

什麼是發燒？

發燒是一種常見的症狀，是因為身體產生的熱量多於消失的熱量，體溫升高超過正常的溫度就是發燒。正常的體溫：口溫是攝氏36.5—37.5度，腋溫是攝氏36—37度，肛溫是攝氏37—38.1度。發燒時會感覺皮膚乾熱、臉部會潮紅、呼吸淺又快、心跳加速，有時也會覺得噁心想吐、沒胃口、頭痛或全身不舒服等現象。引起發燒的原因很多，最主要的是受了病毒或細菌的感染，如感冒、扁桃腺發炎、腦炎，其次是環境太熱，出汗太多，身體熱量無法散發，如中暑、高溫下工作者常易發生。



如何測量體溫？

體溫計的種類有水銀的、電子的及紅外線體溫計，其中以水銀體溫計最普遍而且最準確。

水銀體溫計又分三種，其差別在水銀端，口溫表、腋溫表的水銀端較細長，肛溫表的水銀端較粗短並有紅色標記。刻度是從攝氏表35度到42度，每一小格代表0.1度。



(一) 口溫測量方法：

1. 體溫計先以冷水清洗，然後擦拭乾淨。
2. 檢查體溫計有無破損。
3. 將體溫計水銀甩至攝氏35度以下。
4. 將體溫計水銀端放置在患者舌下。
5. 請患者將嘴唇緊閉以固定體溫計。
6. 測量3—5分鐘。
7. 將體溫計拿出，用衛生紙將口水擦淨。
8. 查看體溫度數。
(病人神志不清或口腔有破洞潰爛不宜用口溫測量)

(二) 腋溫測量方法：

用於不適合量口溫或肛溫情況下：

1. 勿於洗澡後測量，測量前先擦乾腋下。
2. 將體溫計之水銀端放到患者腋下中心。
3. 請患者將手臂放到胸前以夾緊體溫計，如病人無力或是嬰兒小孩，則幫其固定手臂和體溫計。
4. 量8—10分鐘後取下，查看度數。



口溫／腋溫



口溫／腋溫



肛溫

(三) 肛溫測量方法：

肛溫是最準確的體溫測量法，病人有腹瀉、肛門受傷或手術後，以及心臟病人不適合量肛溫。

- 1.先用少許凡士林潤滑水銀端。
- 2.插入肛門成人、兒童約2.5公分，嬰兒約1.25公分。
- 3.固定肛溫表，量3—5分鐘後取出，查看度數。

什麼情況應量體溫？

需要測量體溫的情況如下：

- 1.當一個人疲倦不舒服或有發熱感覺時。
- 2.常有頭痛、胸痛、腹痛、喉嚨痛、嘔吐、腹瀉或皮膚有疹子。
- 3.生病時，每天在同一時間測量1-2次，需要時每4小時測量一次，通常在早晨或晚間測量。當病情突然改變，有發冷、不安或昏睡的情況時也要測量。

發燒時怎麼處理？

- 1.測量體溫，了解體溫多高。
- 2.多喝水或果汁，給予容易消化的食物。但避免喝咖啡或酒精性的飲料，並且可以用淡鹽水漱口。
- 3.口溫在攝氏38度以上時，應在患者的額頭上使用冰袋或睡冰枕。如高過39度時，可給予溫水拭浴（用小毛巾沾濕攝氏約26.7—37度的溫水，輕拍沾濕全身，避免



用力擦拭)，可以有效的降低體溫。

4. 安排安靜涼爽的環境，保持室內通風，但不要直接對病人吹風或吹冷氣，盡量讓病人臥床休息，病人需要有充分的睡眠，避免給穿太多的衣服或蓋太厚的被子，衣服盡量穿輕薄柔軟之棉質睡衣。如有出汗時，立即擦乾，需要時，更換乾爽的衣服。
5. 如病人有發冷、發抖的現象，應給予保暖，同時可給熱茶或熱湯。
6. 小孩子發高燒時容易引起抽筋，除了衣服不要穿著太多外，要在上下牙齒間放置硬物，以防咬傷舌頭，但勿強行將硬物置入口中，防牙齒受損或口腔外傷，並緊急送醫。
7. 如果發燒一直持續不退或高到攝氏39度以上，或伴有其他症狀，如皮膚有紅疹、關節紅腫、疼痛或呼吸困難，應緊急送醫治療。
8. 切勿自行購買服用成藥減輕症狀，而不易診斷真正的疾病。



腹瀉怎麼辦？

什麼是腹瀉？

腹瀉就是俗稱的「拉肚子」，正常人每日的大便是黃褐色、成條狀、質地軟，一天排1—2次，拉肚子時，大便次數變多而且變得較稀或呈現水狀，一般會有肚子痛、便急、脫水、口渴及疲倦等症狀。引起腹瀉的原因，最





主要是吃了或喝了不乾淨的食物或刺激性食物，腸胃無法容納這些不當的食物，因而發生腹瀉，也有少數的人因感冒而有腹瀉的症狀。

腹瀉時怎麼處理？

1. 先了解可能是什麼原因引起腹瀉？家中其他人是否有腹瀉？腹瀉物像水或泡沫狀或黏液狀？次數多少？
2. 暫時給患者多喝開水或淡鹽水，不要吃其他東西。如果病人有噁心想吐時，開水也不可以喝。
3. 用大毛巾將腹部包起來以保暖，並讓患者躺下來休息。
4. 多次的腹瀉會使肛門周圍紅痛，所以每次大便時使用細軟的紙或棉花沾濕擦肛門，然後用溫水擦洗肛門周圍。
5. 安慰患者，盡量放鬆緊張焦慮的情緒。
6. 除了醫師的指示外，不可自行購買抗生素(即消炎藥)或止瀉藥服用，以免延誤病情。
7. 如果腹瀉多次且情況未改善，伴有噁心、嘔吐、發燒或者大便中有血或黏液或泡沫時，可能表示患有傳染性疾病，應該盡速送醫診治。
8. 情況改善時，才可開始吃煮過的食物，以少量多餐的方式，再慢慢增加量，但仍應避免粗糙的蔬菜、水果、油炸的、刺激性食物與酒精性飲料、牛奶及奶製品。

嬰幼兒常見疾病的症狀及處理方法

由於嬰幼兒的抵抗力比較差，稍不留意就容易罹患各種疾病，了解嬰幼兒常見疾病的徵候及處理方法，將可以減少許多健康問題的發生。

名稱	徵候	處理方法
尿布疹	一般反應為廣泛性紅斑，表面粗糙如牛皮紙，嚴重時會出現水泡或膿疱	1.勤換尿布保持皮膚乾燥 2.大小便後，將臀部洗乾淨 3.皮膚發炎較厲害需就醫
腸套疊	1.突發性、痙攣性腹痛，常伴有嘔吐、不安、雙腿彎曲 2.腹痛後顯得倦怠、蒼白、出冷汗 3.大便呈粉紅色果膠樣	儘速送醫
水痘	1.發疹前一天會有輕度的發燒、倦怠感、食慾不振 2.開始時疹子和一般丘疹相似，隨後出現小水泡	1.從發疹前二十四小時到發疹後，全部乾燥成痂皮為止，都會接觸傳染注意不要傳染給別人 2.水痘會發癢，抓破會留下疤痕，請就醫改善 3.水痘患過一次終身免疫
便秘	大便質地變硬、堅實、次數變少或數天才有一次大便	1.吃奶的孩子，由於消化完全，殘渣較少，只要加上副食品或大量果糖的白梅汁可改善 2.較大小孩增加含量較多的蔬菜、水果，減少脂肪含量較高的食物
膿痂疹	常先有突起、紅腫、膿疱、局部發癢	1.症狀出現需就醫，依醫師指示積極治療 2.每天換洗所穿衣服、面巾、被單等
隱睾症	是指男孩的睪丸未下降到陰囊內	發現時機——嬰兒於浴盆時觸摸兩邊睪丸是否下降、六歲前幼兒站立腹部用力（如吹氣球）時檢查
疝氣	腸子墜入腹腔溝（跨下）或陰囊內謂之疝氣，尤其是男孩子，小孩腹部用力（如哭、咳嗽）疝氣會增大，躺臥及睡覺時會消失	疝氣若不能回復，可能形成腸壞死，需立即送醫

寶寶健康備忘錄

各大醫院一覽表

所在縣市	醫院名稱	醫院電話	醫院地址
台北市	國立台灣大學醫學院附設醫院	02-23123456	台北市常德街一號
台北市	台北榮民總醫院	02-28712121	台北市石牌路二段二〇一號
台北市	三軍總醫院	02-23659055	台北市內湖區成功路二段三二五號
台北市	財團法人馬偕紀念醫院及其淡水分院	02-25433535	台北市中山北路二段九二號
台北市	財團法人新光吳火獅紀念醫院	02-28332211	台北市士林區文昌路九五號
台北市	財團法人國泰綜合醫院	02-27082121	台北市仁愛路四段二八〇號
台北市	台北市立萬芳醫院	02-29307930	台北市文山區興隆路三段一一一號
台北市	台北醫學大學附設醫院	02-27372181	台北市吳興街二五二號
台北市	台北市立中興醫院	02-25523234	台北市大同區鄭州路一四五號
台北市	財團法人振興復健醫學中心	02-28264400	台北市北投區振興街四五號
台北市	財團法人基督復臨安息日會臺安醫院	02-27718739	台北市八德路二段四二四號
台北市	台北市立仁愛醫院	02-27093600	台北市大安區仁愛路四段一〇號
台北市	台北市立忠孝醫院	02-27861288	台北市南港區同德路八七號
台北市	台北市立陽明醫院	02-28353465	台北市士林區雨聲街一〇五號
台北市	國軍松山醫院	02-27648851	台北市松山區健康路一三一號
台北市	台北市立和平醫院	02-23889595	台北市中山區中華路二段三三號
台北市	財團法人專克亮基金會和信治療中心醫院	02-28970011	台北市北投區立德路一二五號
台北市	台北市立婦幼綜合醫院	02-23916471	台北市中正區福州街一二號
基隆市	財團法人長庚紀念醫院基隆分院	02-24313131	基隆市麥金路二二二號
基隆市	行政院衛生署基隆醫院	02-24292525	基隆市信二路二六八號
基隆市	國軍基隆醫院	02-24634437	基隆市中正區正榮街一〇〇號
台北縣	財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院	02-29546200	台北縣板橋市南雅南路二段二一號
台北縣	財團法人天主教耕莘醫院	02-22199509	台北縣新店市中山路三六二號

所在縣市	醫院名稱	醫院電話	醫院地址
台北縣	行政院衛生署台北醫院	02-29927575	台北縣新莊市愚賢里思源路一二七號
台北縣	財團法人恩主公醫院	02-26723456	台北縣三峽鎮復興路三九九號
宜蘭縣	羅東博愛醫院	03-9543131	宜蘭縣羅東鎮南昌街八三號
宜蘭縣	羅東聖母醫院	03-9568470	宜蘭縣羅東鎮中正南路一六〇號
新竹市	行政院衛生署新竹醫院	03-5326151	新竹市經國路一段四四二巷二五號
新竹市	財團法人馬偕紀念醫院新竹分院	03-6119595	新竹市光復路二段690號
新竹縣	東元綜合醫院	03-5527000	新竹縣竹北市縣政二路六九九號
桃園縣	財團法人長庚紀念醫院及其林口分院及其林口兒童分院	03-3281200	桃園縣龜山鄉公西村復興街五號
桃園縣	國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處	03-4799595	桃園縣龍潭鄉中興路一六八號
桃園縣	行政院衛生署桃園醫院	03-3699721	桃園縣桃園市中山路一四九二號
桃園縣	壠新醫院	03-4941234	桃園縣平鎮市廣泰路七七號
桃園縣	桃園榮民醫院	03-3384889	桃園縣桃園市成功路三段一〇〇號
桃園縣	敏盛綜合醫院	03-3379340	桃園縣桃園市三民路三段一〇六號
桃園縣	財團法人天主聖母保祿修女會醫院	03-3613141	桃園縣桃園市建新街一二三號
苗栗縣	行政院衛生署苗栗醫院	037-261920	苗栗縣苗栗市義盛里為公路七四七號
苗栗縣	財團法人為恭紀念醫院	037-676811	苗栗縣頭份鎮仁愛路一一六號
台中市	澄清綜合醫院	04-24632000	台中市平等街一三九號
台中市	澄清綜合醫院中港分院	04-24632000	台中市中港路三段一一八號
台中市	行政院衛生署台中醫院	04-22294411	台中市三民路一段一九九號
台中市	林新醫院	04-22586688	台中市南屯區惠中路三段三六六號
台中市	中山醫學大學附設醫院及其復健醫院	04-24739595	台中市南區建國北路一段一一〇號
台中市	台中榮民總醫院	04-23592525	台中市中港路三段一六〇號
台中市	中國醫藥大學附設醫院	04-22062121	台中市育德路七五號
台中縣	財團法人仁愛綜合醫院	04-24819900	台中縣大里市東榮路四八三號
台中縣	光田綜合醫院	04-26620929	台中縣沙鹿鎮沙田路一一七號

所在縣市	醫院名稱	醫院電話	醫院地址
台北市	國立台灣大學醫學院附設醫院	02-23123456	台北市常德街一號
台中縣	光田綜合醫院大甲分院	04-26620929	台中縣大甲鎮經國路三二一號
台中縣	置綜合醫院	04-26626161	台中縣沙鹿鎮成功西街八號
台中縣	李綜合醫院大甲分院	04-26862288	台中縣大甲鎮平安里八德街二號
台中縣	行政院衛生署豐原醫院	04-25271180	台中縣豐原市安康路—00號
彰化縣	財團法人彰化基督教醫院	04-7238595	彰化縣彰化市中華路一七六號
彰化縣	秀傳紀念醫院	04-7256166	彰化縣彰化市中山路一段五四二號
雲林縣	國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區)	05-5323911	雲林縣斗六市鎮西里雲林路二段五七九號
雲林縣	財團法人天主教若瑟醫院	05-6337333	雲林縣虎尾鎮新生路七四號
嘉義市	財團法人嘉義基督教醫院	05-2765041	嘉義市忠孝路五三九號
嘉義市	行政院國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民醫院	05-2756000	嘉義市大雅路二段五六五號
嘉義市	財團法人佛教慈濟綜合醫院大林分院	05-2359630	嘉義市西區劉厝里世賢路二段六00號
嘉義縣	財團法人佛慈慈濟綜合醫院大林分院	05-2648000	嘉義縣大林鎮民生路二號
嘉義縣	財團法人長庚紀念醫院嘉義分院	05-3621000	嘉義縣朴子市嘉朴路西段六號
嘉義縣	華濟醫院	05-2373823	嘉義縣太保市北港路二段六0—巷六六號
台南市	國立成功大學醫學院附設醫院	06-2353535	台南市勝利路一三八號
台南市	財團法人台灣基督長老教會新樓醫院	06-2748316	台南市東門路一段五七號
台南市	台南市立醫院	06-2609926	台南市崇德路六七0號
台南市	行政院衛生署台南醫院	06-2200055	台南市中西區廣慈里中山路一二五號
台南市	郭綜合醫院	06-2221111	台南市西區民生路二段二號
台南縣	財團法人奇美醫院及其台南分院	06-2812811	台南縣永康鄉中華路九0—一號
高雄市	高雄榮民總醫院	07-3422121	高雄市左營區大中路三八六號
高雄市	高雄醫學院附設中和紀念醫院	07-3121101	高雄市三民區十全一路—00號
高雄市	阮綜合醫院	07-3351121	高雄市苓雅區成功一路一六二號
高雄市	高雄市立小港醫院	07-8036783	高雄市小港區山明路四八二號

所在縣市	醫院名稱	醫院電話	醫院	住 址
台北市	國立台灣大學醫學院附設醫院	02-23123456	台北市常德街一號	
高雄市	國軍高雄總醫院	07-7498566	高雄市苓雅區中正一路二號	
高雄市	國軍左營醫院 附設民眾診療服務處	07-5879651	高雄市左營區軍校路五五三號	
高雄市	高雄市立民生醫院	07-7511131	高雄市苓雅區凱旋二路一三四號	
高雄市	高雄市立聯合醫院(本院)	07-2618131	高雄市鼓山區中華一路九七六號	
高雄市	高雄市立聯合醫院(大同院區)	07-552565	高雄市前金區中華三路六八號	
高雄縣	財團法人長庚紀念醫院高雄分院	07-7317123	高雄縣鳥松鄉大埤路一二三號	
高雄縣	財團法人義大醫院	07-6150011	高雄縣燕巢鄉角宿村義大路1號	
屏東縣	行政院衛生署屏東醫院	08-7363011	屏東縣屏東市自由路二七〇號	
屏東縣	安泰醫院	08-8329966	屏東縣東港鎮中正路一段二一〇號	
屏東縣	財團法人屏東基督教醫院 及其瑞光分院	08-7363026	屏東縣屏東市大連路六〇號	
屏東縣	寶建醫院	08-7665995	屏東縣屏東市中山路一二三號	
台東縣	馬偕紀念醫院台東分院	089-310150	台東縣台東市長沙街三〇三巷一號	
花蓮縣	財團法人台灣基督教門諾會醫院	03-8227161	花蓮縣花蓮市民權路四四號	
花蓮縣	國軍花蓮總醫院 附設民眾診療服務處	03-8262519	花蓮縣新城鄉嘉里村嘉里路一六三號	
花蓮縣	財團法人佛教慈濟綜合醫院	03-8561825	花蓮縣花蓮市新生南路八號	
花蓮縣	行政院衛生署花蓮醫院	03-8358141	花蓮縣花蓮市明禮路四號	
澎湖縣	行政院衛生署澎湖醫院	06-9261151	馬公市中正路10號	
澎湖縣	國軍澎湖醫院附設民眾診療處	06-9211116	馬公市前寮里68號新生路199號	
金門縣	金門縣立醫院	082-332546		
金門縣	金門花崗石醫院	082-332865		
	烈嶼醫院	082-362078		

附錄
