

恙蟲病

恙蟲病是一種由立克次體所引起之傳染病，此種疾病不會由人傳給人；由於恙蟲之幼蟲主要以鼠類為其宿主，因此消滅鼠類有助於防止恙蟲病傳播。

Q 恙蟲病如何傳播？

A 恙蟲喜停留於雜草之尖端，伺機叮咬人，因此民眾易因接觸草叢而被感染。恙蟲病確定病例中，以接觸住家或工作環境之草叢，例如種菜、農務，或從事休閒活動，如登山、散步者居多。

Q 恙蟲病常見的症狀？

A 發燒、頭痛、背痛、盜汗、淋巴腺發炎腫大、出疹、結膜充血等，在遭恙蟲叮咬處會形成焦痂。

Q 恙蟲病之致死率？

A 若得到恙蟲病未經妥適治療，致死率可能達到60%。

預防恙蟲病小撇步：

自我保護

- ✓ 進入草叢，應著長袖、長褲，最好可著長靴及戴手套。
- ✓ 身體裸露處塗抹經衛生署核可之驅蟲劑(含敵避 DEET)。
- ✓ 回家後請立刻沐浴，並換洗全部衣物。



居家清潔

- ✓ 做好家戶社區環境衛生，包括：除草、滅鼠等工作。

主動就醫

- ✓ 若有高燒、頭痛或出現焦痂，請儘速就醫。
- ✓ 告知醫師旅遊史或有無出入草叢等暴露史。

恙蟲的生活史

