

伊波拉

小檔案



伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病，其初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛與咽喉痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。透過接觸受感染動物、感染者或其屍體之血液或體液而感染。病人於潛伏期(2-21天)不具傳染力，出現症狀後才具傳染力。



/ 潛伏期


2~21天，平均為4~10天。

另男性病患於康復後3個月內，精液仍可能帶有病毒，故男性病患於這段時間應避免性行為，或使用保險套。




/ 傳染途徑

透過接觸傳染，此病毒可直接由動物傳染給人。如接觸到受感染動物的血液、分泌物等，或是透過中間宿主之野生動物，例如受感染的猴、猿等再傳染給人。



人與人之間的傳染，是因直接接觸到被感染者或其屍體之血液、分泌物、器官、精液等；或是間接接觸被感染者體液污染的環境(如衣服、床罩或針頭等)而感染。目前尚未有藉由空氣微粒傳播的案例。



/ 發病症狀

初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。



重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。個案致死率可高達9成。