


### 七. 目前政府是否有補助治療C型肝炎?

為降低肝硬化及肝癌之發生率，自92年10月起，由中央健康保險局推動「全民健保加強慢性B型及C型肝炎治療試辦計畫」；有關治療對象之給付標準及合約醫院之規定，請參閱中央健康保險局網站 [www.nhi.gov.tw](http://www.nhi.gov.tw)。



# 要愛肝，不要C肝!

牙刷針具勿共用 刺青耳洞別跟進  
病毒有藥可治療 定期追蹤免煩惱



衛生署疾病管制局 關心您  
疫情通報及諮詢專線 1922

台北市林森南路6號  
<http://www.cdc.gov.tw>



### 一. 什麼是慢性C型肝炎?

當血液中C型肝炎抗體 (Anti-HCV) 呈現陽性，且肝功能異常起伏不定持續六個月以上時，表示患有慢性C型肝炎。慢性C型肝炎來自急性C型肝炎，一般急性C型肝炎至少有60%以上會演變成慢性肝炎，更可能進一步演變成肝硬化或肝癌。


### 二. C型肝炎怎樣傳染的?

C型肝炎是經由含有C型肝炎病毒的血液或體液透過皮膚或粘膜進入體內而感染。其傳染途徑包括：**輸血、打針、血液透析、針灸、刺青、紋眉、穿耳洞、共用牙刷或刮鬍刀、不安全之性行為等。**

### 三. 如何知道是否已感染了C型肝炎?

感染C型肝炎時可能會有疲倦、上腹脹、厭食等症狀，但是也有很多人沒有明顯的症狀，常常在做健康檢查時被發現感染C型肝炎。因此只有抽血檢驗C型肝炎抗體，才能確定是不是感染了C型肝炎。

感染C型肝炎後，體內會產生**C型肝炎抗體 (Anti-HCV)**，這個抗體和B型肝炎的表面抗體性質不同，**不具有保護作用，因此對於C型肝炎病毒沒有免疫力。**若抽血檢驗這個抗體結果為陽性時，表示體內可能還有C型肝炎病毒存在。



### 四. C型肝炎會經由輸血而感染嗎?

會。以往輸血是C型肝炎的主要感染途徑，叫做「輸血後C型肝炎」；但自民國81年7月起，我國捐血中心的血源都要經過C型肝炎抗體的篩檢陰性後才能使用於輸血，因此發生的機會已甚小。機會雖然很小，不必要的輸血還是要儘量避免。

### 五. 怎樣預防C型肝炎感染?

目前並無C型肝炎疫苗可預防，特別注意避免行為如輸血、打針、刺青、紋眉、穿耳洞等及與他人共用牙刷、刮鬍刀、針頭、針筒及輸液管等，以預防病毒的入侵。另外，多重性伴侶及嫖妓等行為，亦會增加感染C型肝炎之機會，故應注意安全性行為如正確使用保險套。

### 六. C型肝炎可以治療嗎?

目前治療C型肝炎的藥物包括干擾素 (Interferon) 與抗病毒藥物如 (Ribavirin) 兩大類，臨床經驗顯示，以此兩類藥物進行組合療法 (combination therapy) 可以有不錯的療效。

