

注意事項

登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，是一種藉由病媒蚊叮咬而傳播的急性傳染病，不會經由人直接傳染給人。登革熱依病情嚴重程度可分為「典型登革熱」及「登革出血熱」兩種：

典型登革熱

症狀包括發燒（38°C以上）、頭痛、骨頭關節及肌肉疼痛、後眼窩痛，發燒3-4日後皮膚會出紅疹，經由適當治療，致死率低於1%。

我們是登革熱型拍檔



登革出血熱

初期症狀與典型登革熱相似，但在發燒3-4天後，身體會有出血及血漿滲出現象，臨床上會出現腹水和肋膜積水，嚴重時可能引起休克，若未及時就醫治療，死亡率可達10-50%。早期診斷並加以適當治療，死亡率可低於5%。

● 錯誤觀念澄清 ●

曾感染登革熱，就終生免疫了嗎？

登革病毒有四型，再次感染同型病毒，可獲長時間免疫。若感染不同型別，不但不具免疫力，更可能導致登革出血熱。

1922

疫情通報及諮詢專線

登革熱 蚊化中心



導覽手冊

中心簡介

話 說斑蚊家族是由「白線斑蚊」與「埃及斑蚊」這兩大勢力共同組成，這些家族成員們最喜歡出沒於陰暗、潮濕、不通風的地方，像是房子周圍的雜物堆、草叢、防火巷、菜園、樹蔭下、涼亭周邊、地下室等陰涼處所，都是他們的聚會場所。而成員們的小孩(子子)通常都會在積水的地方玩耍，像花瓶、空瓶罐、水缸、水桶等地方；他們的生活習慣漸漸構成獨樹一格的「蚊化中心」...

埃及斑蚊

特徵：胸部背側有一對彎曲白線，中間有兩條縱線，腳部有黑白相間斑紋。

習性：喜歡在室內活動，多棲息在陰暗、潮濕、不通風的角落；在臥室，多停留於牆角、窗簾及懸掛之深色衣服上。



我最懶!

白線斑蚊

特徵：胸部背面有一條白線，腳部有黑白相間斑紋。

習性：喜歡棲息在室外，主要分布於全島平地及1500公尺以下山區，叮咬人的高峰時刻約在日出後1-2小時，及日落前2-3小時。



這裡是我們的家!

環境導覽

擔心會被斑蚊家族的勢力侵占嗎？

最根本的方法就是落實環境清潔！例如：屋前屋後的排水溝、廢棄容器以及花盆底盤都是清理的重點！一旦發現重大孳生源，請立即通報縣市政府，齊心掃除斑蚊家族惡勢力，共同營造「無蚊家園」新勢力。

我最愛在廢棄的無人空屋，好好偷懶休息一番...

徜徉悠游於久未疏通的水溝中，真是太舒服了。

花盆底盤的積水區域，是游泳踏水的最佳練習場！

這些瓶瓶罐罐的積水容器可是打水仗的好地方！

嗡嗡
社區蚊化中心



登革熱蚊化中心 導覽手冊

中心簡介

話說斑蚊家族是由「白線斑蚊」白線斑蚊」與「埃及斑蚊」這兩大勢力共同組成，這些家族成員們最喜歡出沒於陰暗、潮濕、不通風的地方，像是房子周圍的雜物堆、草叢、防火巷、菜園、樹蔭下、涼亭周邊、地下室等陰涼處所，都是他們的聚會場所。而成員們的小孩（孑孓）通常都會在積水的地方玩耍，像花瓶、空瓶罐、水缸、水桶等地方；他們的生活習慣漸漸構成獨樹一格的「蚊化中心」...

埃及斑蚊

特徵：胸部背側有一對彎曲白線，中間有兩條縱線，腳部有黑白相間斑蚊。

習性：喜歡在室內活動，多棲息在陰暗、潮濕、不通風的角落；在臥室，多停留於牆角、窗簾及懸掛之深色衣服上。

白線斑蚊

特徵：胸部背面有一條白線，腳部有黑白相間斑蚊。

習性：喜歡棲息在室外，主要分佈於全島平地及 1500 公尺以下山區，叮咬人的高峰時刻約在日出後 1-2 小時，及日落前 2-3 小時。

環境導覽

擔心會被斑蚊家族的勢力侵佔嗎？

最根本的方法就是落實環境清潔！例如：屋前屋後的排水溝、廢棄容器以及花盆底盤都是清理的重點！一旦發現重大孳生源，請立即通報縣市政府，齊心掃除斑蚊家族惡勢力，共同營造「無蚊家園」新勢力。

嗡嗡社區蚊化中心

對白一：我最愛在廢氣的無人空屋，好好偷懶休息一番...

對白二：徜徉悠游於久未疏通的水溝中，真是太舒服了。

對白三：花盆底盤的積水區域，是游泳跳水的最佳練習場！

對白四：這些瓶瓶罐罐的積水容器可是打水仗的好地方！

注意事項

登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，是一種藉由病媒蚊叮咬而傳播的急性傳染病，不會經由人直接傳染給人。登革熱依病情嚴重程度可分為「典型登革熱」及「登革出血熱」兩種：

典型登革熱

症狀包括發燒（38°C 以上）、頭痛、骨頭關節及肌肉疼痛、後眼窩痛，發燒 3-4 日後皮膚會出紅疹，經由適當治療，致死率低於 1%。

登革出血熱

初期症狀與典型登革熱相似，但在發燒 3-4 天後，身體會有出血及血漿滲出現象，臨床上會出現腹水和肋膜積水，嚴重時可能引起休克，若未及時就醫治療，死亡率可達 10-50%。早期診斷並加以適當治療，死亡率可低於 5%。

錯誤觀念澄清

曾經染登革熱，就終生免疫了嗎？

登革病毒有四型，再次感染同型病毒，可獲長時間免疫。若感染不同型別，不但
不具免疫力，更可能導致登革出血熱。

疫情通報及諮詢專線 1922