

傳染性肺結核病患 延遲搭機，旅客更安心

- 1 世界衛生組織建議：傳染性肺結核病患應延遲搭乘八小時以上長途飛機；多重抗藥性(MDR)結核病患無論航程時間長短，均不應搭乘飛機。
- 2 參加都治計畫(DOTS)按規定服藥兩週或不具傳染性即可搭機！



健康的肺，

健康起飛

☎ 1922

疫情通報及諮詢專線



傳染性肺結核病患 貼心小叮嚀

良好習慣不可少

為避免傳染給親朋好友，保持個人良好衛生習慣最重要：

- 1 打噴嚏或咳嗽時，請用手帕或衛生紙掩蓋口鼻。



- 2 吐出的痰液用衛生紙包好，丟入馬桶沖掉。



- 3 室內保持空氣流通、乾燥、陽光充足。

按規定服藥可治好

注意發病後的治療及病情，只要加入結核病「都治計畫」(DOTS，送藥到手、服藥入口、吞下再走)按規定服藥，結核病一定可以治癒。



長途旅程請暫緩

在密閉的飛機座艙中，肺結核有可能會透過空氣傳播，對其他乘客的健康造成威脅。因此，傳染性肺結核病患，若有飛行計畫(特別是八小時以上長途飛行旅程)，請延遲搭機。治療至不具傳染性，即可健康搭機。

您不可不知

台灣每年新發生約4、5千位傳染性肺結核病患，其中2、3百位的多重抗藥性病患，如果沒有好好治療以及適度的規範，傳染性結核病患四處走動，即成為活動性的傳染源...

外出準備要做好

傳染性肺結核病患，請避免出入公共場所。如因特殊因素(如就醫)需出入公共場所，請務必做好戴口罩(至少外科口罩等級)等個人防護措施。



傳染性肺結核病患，必須延遲搭乘飛行達**8小時以上**的長途飛機；多重抗藥性肺結核病患**無論航程時間長短**，均應延遲搭機；上述對象如欲搭機出境者，將於機場出境時，依法攔阻。

● 參與都治計畫(DOTS)遵從醫師指示服藥至不具傳染性，即可搭機。