

## 正面

 <p>衛生福利部國民健康署 關心您</p> <p><a href="http://www.hpa.gov.tw">http://www.hpa.gov.tw</a> TEL：(04)22172421 廣告</p>	<p>紅血球內</p> <p>葡萄糖-六-磷酸鹽脫氫酶缺乏症 (俗稱蠶豆症) (G-6-PD deficiency)</p> <p>應注意事項</p> <p>姓名：_____</p> <p>性別：_____</p> <p>出生：____年____月____日</p> <p>就醫時請攜帶 此卡供醫師參考</p>
--	---

## 背面

<p>「葡萄糖-6-磷酸鹽脫氫酶缺乏症(俗稱蠶豆症)」患者，服用某些藥物或食品，容易發生溶血性貧血。</p> <p>(一)日常生活方面要注意下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 不隨意服藥，所有藥物均需經由醫師處方。</li><li>2. 應避免吃蠶豆或其製品(如蠶豆酥)；不要在衣櫥及廁所放茶丸(臭丸)；需注意使用龍膽紫(紫藥水)，危險性較高。</li><li>3. 使用涼涼含薄荷醇的產品，請諮詢醫師或藥師。</li><li>4. 不推薦使用尤加利樹精油。</li><li>5. 注意是否有黃疸或貧血(臉色蒼白)或尿液呈暗紅色或茶色等急性溶血症狀。</li><li>6. 看病時，應主動告訴醫護人員小孩患有蠶豆症，並出示本卡片。</li></ol>	<p>(二)下列藥物須依醫師處方使用(供醫師參考)：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 抗瘧疾藥物：Hydroxychloroquine</li><li>2. 磺胺類藥物：Sulfamethoxazole、Sulfasalazine、Silver sulfadiazine</li><li>3. 抗生素：Nitrofurantoin、Nalidixic acid、Chloramphenicol、Ciprofloxacin、Levofloxacin</li><li>4. 促尿酸排泄藥：Probenecid</li><li>5. 尿道止癢劑：Phenazopyridine</li><li>6. 止痛退燒藥：Acetylsalicylic acid。請不要隨意使用，在醫師處方下用藥，相對安全。</li></ol> <p>★注意：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 以上只列出兒童常見用藥及生活上常會遇到的狀況，不代表所有物品。</li><li>2. 蠶豆症有非常多不同類型，會不會引起溶血要看缺乏的酵素活性有多少，每個人感受性不一樣，勿過度擔憂。</li><li>3. 假若發現有急性溶血症狀，請儘速帶往醫院診治。</li></ol>
--	--