

手 護寶貝的健康 腸病毒進不來！

打造防護網，媽媽有辦法！

- 勤洗手**
外出回家後、摟抱、餵食寶寶前，請務必洗手。
- 餵母奶**
母奶中含有豐富抗體，多餵母奶能降低感染腸病毒的機率。
- 外出回家後更換衣服**
爸媽從外面回家之後，請先更換衣服再抱寶寶。
- 定期清潔寶寶玩具**
要定期清潔、消毒寶寶的玩具，以免病毒透過玩具傳染。

**若寶寶已感染腸病毒，
請注意是否出現腸病毒重症前兆病徵：**

- 嗜睡：小朋友一直想睡覺，常常意識不清、眼神呆滯或疲倦無力
- 肌躍型抽搐：無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮
- 持續嘔吐：嘔吐為腦壓上升的症狀表現之一，次數愈多愈要注意
- 呼吸急促或心跳加快：小孩安靜且體溫正常時，心跳每分鐘120次以上

如出現以上任何一項，請務必送至大醫院治療！

廣告

**衛生署疾病管制局
TAIWAN CDC**

疫情通報及諮詢專線：**1922** <http://www.cdc.gov.tw>

注意 腸病毒重症 前兆病徵 掌握黃金治療時間

腸病毒輕症期

持續 觀察一週

常見症狀為發燒、疱疹性咽峽炎以及手足口病（手、腳及口腔可能出現紅疹或水泡）

有些抵抗力較差的幼兒可能會轉變為**腸病毒重症**，發現**重症前兆病徵**任何一項請務必送至大醫院治療！

嗜睡 小朋友一直想睡覺，常常意識不清、眼神呆滯或疲倦無力。

肌躍型抽搐 無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮。

持續嘔吐 嘔吐為腦壓上升的症狀表現之一，嘔吐次數愈多愈要注意。

呼吸急促或心跳加快 小孩安靜且體溫正常時，心跳每分鐘120次以上。

醫院

出現**重症前兆病徵**立刻送大醫院！

廣告

**衛生署疾病管制局
TAIWAN CDC**

疫情通報及諮詢專線：**1922** <http://www.cdc.gov.tw>