


五、居家自我保健原則


- (一) 充分休息與睡眠，避免熬夜，
保持身心愉快，適度運動。
- (二) 充分營養、均衡飲食，增加自
體免疫能力。
- (三) 預防腸胃道感染，應注意食物
之清潔與保鮮，減少在外飲
食，避免生食，注意飯前、飯
後洗手。
- (四) 遵照醫師指示按時服用藥物，
不可自行停藥，定期至門診追
蹤。



如有任何問題請打電話至

- (02) 2875-7121 A121 病房
 - (02) 2875-7122 A122 病房
 - (02) 2875-7123 A123 病房
 - (02) 2875-7124 A124 病房
- 我們會竭誠為您服務！

認識肝膿瘍



臺北榮總胃腸肝膽科病房印製

中華民國一〇五年三月

一、什麼是肝膿瘍？

細菌經由血液或膽道淋巴系統進入肝臟，造成局部組織壞死、發炎，產生膿狀物。曾有肝臟疾病，如：膽道阻塞、膽結石、胰臟癌等或以前有過腸胃道感染者較容易產生肝膿瘍。


二、肝膿瘍的症狀

- (一) 發燒、寒顫、食慾不振、黃疸。
- (二) 右上腹疼痛、疲倦無力、噁心、嘔吐。
- (三) 下肢水腫、肝臟壓痛。



三、肝膿瘍的治療

- (一) 醫師依照症狀安排必須之檢驗、檢查，依結果再決定是否需執行經皮膚穿刺肝臟抽吸、經皮膚穿刺肝臟引流或進行外科手術等。
- (二) 抗生素療法至少二週以上。



四、肝膿瘍之引流管照護

- (一) 將引流管以安全別針固定好，小心滑脫落及扭曲，管路應平放於床上，引流袋須低於腰部以下，防止逆流。
- (二) 每天記錄引流量，並觀察引流液顏色、味道及量。
- (三) 傷口應以紗布覆蓋，注意有無滲液，必要時隨時換藥。
- (四) 引流管若發生滑脫應立即通知醫護人員。