

(二) 返室後不適之處理：

1. 輕微腹痛為正常現象，醫護人員將持續追蹤症狀變化。
2. 檢查後如有嚴重腹痛、寒顫或高燒，將給予抽血及抗生素治療。



六、居家自我保健原則

(一) 飲食方面：

低油飲食：烹調方式宜採用烘烤、燉煮、清蒸，少用油炸。

(二) 宜依照自己體能做適當的活動。

(三) 出院回家後如有以下情形應儘速就醫：小便顏色變深、大便呈現灰白色或黑便、皮膚及鞏膜變黃、發燒以及腹部異常疼痛。

(四) 如有引流管，請見「引流管的照顧方式」。



若有任何問題請打電話至

(02) 2875-7121 A121 病房


(02) 2875-7122 A122 病房

(02) 2875-7123 A123 病房

(02) 2875-7124 A124 病房

我們會竭誠為您服務！

逆行性胰膽管攝影術及取石術



臺北榮總胃腸肝膽科病房印製

中華民國一〇五年三月

一、什麼是逆行性膽胰管攝影術？

是經由口腔，放入光纖維內視鏡，經食道、胃到十二指腸的膽管、胰管交會處，利用導管注射顯影劑做 X 光攝影，以檢查膽囊及胰臟等器官之病灶情形。



二、檢查目的

- (一) 了解膽囊、膽管、胰臟方面有無結石、發炎及腫瘤等，以協助診斷。
- (二) 放置鼻膽管。
- (三) 做十二指腸乳突切開取石術。

三、檢查前準備

- (一) 填寫檢查治療同意書。
- (二) 檢查前需禁食 6~8 小時，包含食物、藥物及開水。
- (三) 取下活動假牙，排空膀胱。



四、檢查過程

- (一) 工作人員會送您到檢查室，請確認已取下活動假牙，以利檢查。
- (二) 檢查前先口服 Gascon 懸浮液消脹氣藥、肌肉注射平滑肌鬆弛劑，噴局部麻醉藥，使腸道放鬆及減輕放內視鏡時的不適。
- (三) 左側躺於檢查台上，放入內視鏡時，有作嘔感是正常的，可做深

呼吸或鼻子吸氣、嘴巴吐氣，以利內視鏡放入及減輕不適。

- (四) 檢查過程中請依照檢查人員指示採不同姿勢，如左側躺、俯躺、及平躺等。
- (五) 檢查完畢即可回病房。

五、檢查後注意事項

- (一) 未做取石術者：
 1. 檢查後 1 小時內暫勿禁食，待局部麻醉消失。
 2. 進食前先試喝少許開水，若無噁到或嘔吐情形才可進食（原禁食者除外）。
- (二) 施行取石術者：
 1. 術後將定時測量血壓及心跳。
 2. 取石術後需禁食 24 小時，待醫師評估後才可進食，需要時將施打點滴及藥物。