

察血壓、脈搏及呼吸變化。

- (四) 保持傷口清潔，24 小時後護理人會協助您取下傷口敷料，並觀察傷口癒合情形。
- (五) 治療完成返室後即可進食（原禁食者除外）。

五、檢查後常見之合併症

- (一) 出血：含有冒冷汗、頭暈、脈搏加快、血壓下降、心悸等出血現象。若血液或膽汁堆積於膽囊下會導致上腹痛，在橫膈下則會反射右肩痛。
- (二) 膽汁漏溢。
- (三) 發燒。
- (四) 氣胸或血胸。

六、居家自我保健原則

- (一) 飲食：可正常飲食。
- (二) 活動：於穿刺後一週內需避免做增加胸腹壓的動作，如彎腰舉重物、用力解便、劇烈運動…等。
- (三) 注意事項：返家後自行檢視傷口若有硬塊、發紅、分泌物等情形，需再返診。




若有任何問題請打電話至

- (02) 2875-7121 A121 病房
- (02) 2875-7122 A122 病房
- (02) 2875-7123 A123 病房
- (02) 2875-7124 A124 病房

我們會竭誠為您服務！

肝臟切片檢查



台北榮民總醫院胃腸科病房印製

中華民國九十九年二月

一、檢查目的

在超音波的導引下，用探針直接穿刺到肝臟組織，取出病變部位的組織供病理檢查及診斷。

二、檢查前準備

- (一) 抽血檢查血小板及凝血功能。
- (二) 填寫「檢查治療同意書」。
- (三) 禁食至少 6~8 小時，包括食物、藥物及水。
- (四) 練習吸氣後屏住呼吸約 20~30 秒，以防抽取肝組織時傷及橫膈膜。
- (五) 靜脈注射。
- (六) 送檢查前先解小便，排空膀胱。
- (七) 送檢地點：推床至十二樓超音波室或二樓超音波室。

三、檢查過程

- (一) 平躺或側臥，右手置於頭下，露出腹部穿刺的部位（圖一）。
- (二) 經由超音波定位（圖二）。

- (三) 醫師選擇適當部位消毒。消毒後，手不可接觸消毒部位。
- (四) 配合醫師指示做吸氣、吐氣、閉氣的動作，在超音波導引下用探針穿刺肝臟。此時，勿隨意移動身體，避免組織受損（圖三）。
- (五) 治療完畢，以砂袋加壓穿刺部位止血（圖四）。



(圖一)



(圖二)



(圖三)



(圖四)

四、檢查後注意事項

- (一) 返室後砂袋直接加壓於穿刺部位 6 個小時，並觀察穿刺部位有無滲血情形。
- (二) 維持舒適臥姿，採平躺或側臥，必須絕對臥床 6 小時。
- (三) 護理人員將於 24 小時內密切觀