

HPV疫苗保護力有多久

因目前追蹤受試者的時限最長為約12年，所以尚無法證實接種HPV疫苗後可維持多長的保護效期。最新資料顯示「保蓓」(二價疫苗)至少9.4年，「嘉喜」疫苗(四價疫苗)保護力至少12年，「嘉喜」疫苗(九價疫苗)保護力至少6年，但長期保護力仍須持續觀察方能確定。

誰需要打HPV疫苗

世界衛生組織(WHO)建議，HPV疫苗應納入國家疫苗接種計畫，且對9-14歲沒有性經驗且未曾感染人類乳突病毒的女生接種較有效益，這也是政府提供國一女生疫苗接種之原因。

國一
女生



接種疫苗注意事項

- 懷孕或準備懷孕者不宜接種。接種前如有以下情形者，應告知醫師並請醫師評估：本身有特殊疾病者、藥物和食物過敏史、免疫功能異常、出血性問題、任何身體不適如發燒、感染。如果接種後發現已懷孕，無須驚慌，只要停止後續尚未接種的劑數即可。
- 接種HPV疫苗可能發生的常見副作用為注射部位疼痛、局部腫脹、發癢、輕微發燒、頭痛、頭暈等，大多屬輕微至中等程度且為時甚短。
- 接種後應原地休息30分鐘，沒有任何不適症狀再離開，如果之後有任何不舒服的情形都請通知學校校護、醫療院所或衛生所等原接種單位，亦可撥打HPV疫苗服務專線0800-88-3513(寶貝，守護一生)。



施打HPV疫苗 守護健康 保護自己



守護健康
衛生福利部 國民健康署 廣告

國民健康署運用菸品健康福利捐支應

什麼是HPV

人類乳突病毒(Human Papillomavirus,簡稱HPV)是一種病毒，會感染人體的表皮與黏膜組織。它有一百多型，分為低危險型與高危險型，是重要的性接觸傳染病源。

什麼是HPV疫苗

持續感染高危險型人類乳突病毒(HPV)是子宮頸癌發生的主因，目前已研發出可預防人類乳突病毒感染的疫苗，因疫苗的涵蓋價數不同，理論上可以預防60-90%的HPV感染。目前我國核准之疫苗，分為保蓓Cervarix、嘉喜(四價)Gardasil、嘉喜(九價)Gardasil9三種。疫苗上市前經過嚴謹的安全性試驗評估，顯示HPV疫苗是安全且有效的。

HPV疫苗介紹



疫苗名稱	保蓓 Cervarix		嘉喜(四價) Gardasil		嘉喜(九價) Gardasil 9	
適用對象	9-14歲；女性	15歲以上；女性	9-13歲；女性	14-45歲女性 9-26歲男性	9-14歲 女性、男性	15-45歲 女性、男性
施打劑數	2劑	3劑	2劑	3劑	2劑	3劑
第1劑	第0個月		第0個月		第0個月	
第2劑	第1劑後6個月	第1劑後1個月	第1劑後6個月	第1劑後2個月	第1劑後6個月	第1劑後2個月
第3劑	X	第1劑後6個月	X	第2劑後4個月	X	第2劑後4個月
適應症 預防型別	HPV第16、18型		HPV第6、11、16、18型		HPV第6、11、16、18、31 33、45、52和58型	

疫苗資訊均記載於仿單中，最新仿單資訊請查詢食品藥物管理署網站
<http://www.fda.gov.tw/TC/index.aspx>

相關資訊請上國民健康署官網

<http://www.hpa.gov.tw>

如有發生不良事件，請撥打
免費服務專線0800-88-3513
或通報至食品藥物管理署不良反應
通報系統(<http://adr.fda.gov.tw>)
或藥物不良反應通報系統
02-23960100

110年10月出版