

五、自我評估，比較及勾選您在乎的重點：

	施打疫苗	不施打疫苗
方案內容	☐ 施打兩劑或三劑疫苗，得到適當的防護力。	☐ 和醫療人員討論如何降低感染機率，如：安全性行為。
優點	☐ 降低得到子宮頸癌的機率。 ☐ 降低得到其他因人類乳突病毒引起的疾病機率。	☐ 可避免因施打疫苗引起的副作用。 ☐ 不用花錢、花時間至醫院打針。
缺點	☐ 可能有部份施打後的副作用，如：疼痛、疲勞。 ☐ 費用較高。	☐ 得到因人類乳突病毒引起的各種疾病的機率較高。 ☐ 感染後可能將病毒傳染給您的伴侶。

六、我應該施打人類乳突病毒疫苗嗎？

決定施打的原因			決定不施打的原因		
❶ 我願意做任何努力來降低得到子宮頸癌機率。			我覺得被感染的機率很低，不需要施打疫苗。		
3分	2分	1分	3分	2分	1分
❷ 我可以忍受施打疫苗後可能導致的部分副作用。			我無法忍受施打疫苗後可能導致的部分副作用。		
3分	2分	1分	3分	2分	1分
❸ 我覺得雖然費用高，但仍值得。			我覺得可以用其他方式來預防感染。		
3分	2分	1分	3分	2分	1分

註：得分加總後，分數較高的為您的選擇傾向。但此僅為傾向分析，建議您仍須與醫療團隊討論適合您的選項。

七、我已具備人類乳突病毒疫苗相關的知識嗎？(是非題)

- () 1. 人類乳突病毒傳染途徑多透過性行為。
- () 2. 施打人類乳突病毒疫苗可預防所有種類的人類乳突病毒。
- () 3. 人類乳突病毒疫苗只有預防效用，並無治療效果。

八、準備好決定了！

經由閱讀以上的相關資訊和自我評估後，我決定：

- ☐ 施打人類乳突病毒疫苗。
- ☐ 不施打人類乳突病毒疫苗。

溫馨提醒

本疫苗無法100%預防子宮頸癌，您仍應遵守子宮頸癌預防**三道防線**：安全性行為、接種疫苗、定期抹片篩檢。

◆用藥諮詢專線：

(04) 7238595 轉3157(日)
轉3150(夜)

◆網址：<http://pharm.cch.org.tw>

參考資料：


- UpToDate 2018.
 - 國民健康署網站：
<https://www.hpa.gov.tw/home/index.aspx>
 - 藥品仿單
- 藥學部、婦產部共同編著

制定日期：2018年10月（第一版）

編碼：6900-單張-中文-022-01

題號	1	2	3
解答	O	X	O

我應該施打人類乳突病毒疫苗嗎？



藥學部編製



JCI國際認證




SINCE 1896

彰化基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

一、什麼是人類乳突病毒疫苗？

子宮頸癌主要是因為感染人類乳突病毒(Human papillomavirus，簡稱HPV)，傳染途徑多透過性行為。人類乳突病毒有超過百種類型，子宮頸癌約有70%由第16、18型病毒引起，另20%由第31、33、45、52、58型導致；而尖性濕疣(俗稱菜花)約90%由第6、11型造成。



二、誰適合接種人類乳突病毒疫苗？

無正在罹患子宮頸癌或癌前期且符合衛福部施打條件者皆可接種，以無性經驗者接種效果較佳。

三、接種注意事項：

- 1. 接種前如有以下情形，請告知醫師：懷孕或準備懷孕、有特殊疾病、藥物和食物過敏史、免疫功能異常、出血性問題、任何身體不適如發燒、感染。
- 2. 接種後應原地休息30分鐘，沒有任何不良反應再離開。

四、人類乳突病毒疫苗選擇有哪些？

藥品外觀			
疫苗名稱	保蓓Cervarix(二價HPV疫苗)	嘉喜Gardasil(四價HPV疫苗)	嘉喜Gardasil 9(九價HPV疫苗)
防護之病毒型	第16、18型	第6、11、16、18型	第6、11、16、18、31、33、45、52、58型
衛福部許可施打年齡	≥9歲女性	9-45歲女性、9-26歲男性	9-26歲女性及男性
衛福部許可適應症	◎9-25歲女性：預防 1.子宮頸癌 2.第2級與第3級子宮頸上皮內贅瘤和子宮頸原位腺癌 3.第1級子宮頸上皮內贅瘤 4.第1級外陰上皮內贅瘤及第1級陰道上皮內贅瘤 ◎26歲以上女性：預防 第1級子宮頸上皮內贅瘤	◎9-26歲女性：預防 1.子宮頸癌前期或分化不良的病變和癌症 2.陰道及外陰部癌前期或分化不良的病變 3.生殖器疣(俗稱菜花) ◎27-45歲女性：預防 1.人類乳突病毒持續性感染 2.第1級子宮頸上皮內贅瘤 3.生殖器疣(俗稱菜花) ◎9-26歲男性：預防生殖器疣	◎9-26歲女性：預防 1.子宮頸癌 2.生殖器疣(尖型濕疣) 3.第1級子宮頸上皮內贅瘤、第2級與第3級子宮頸上皮內贅瘤 4.子宮頸原位腺癌、第2級與第3級外陰上皮內贅瘤、第2級與第3級陰道上皮內贅瘤 ◎9-26歲男性：預防生殖器疣
注射方式	肌肉注射	肌肉注射	肌肉注射
常見副作用	肌肉酸痛、施打部位疼痛、疲倦	同左	同左
施打時程	◎三劑，在第0、1、6個月施打 ◎9-14歲：可以施打兩劑或三劑 如施打兩劑，兩劑間隔5~13個月	◎三劑，在第0、2、6個月施打 ◎9-13歲：可以施打兩劑或三劑 如施打兩劑，兩劑間隔6~12個月	◎三劑，在第0、2、6個月施打 ◎9-14歲：可以施打兩劑或三劑 如施打兩劑，兩劑間隔6~12個月
預防子宮頸癌	✓	✓	✓
預防生殖器疣(俗稱菜花)	×	✓	✓
施打費用*	一劑約 3,900 元	一劑約 3,500 元	一劑約 4,800 元

*疫苗費用可能因不同醫院而有些微差異。