





中風是什麼？

75%
缺血性中風



25%
出血性中風



大腦血管被血栓阻塞不通，因此腦細胞發生嚴重缺血，就會出現中風症狀。

若不緊急處置趕快讓腦部血流通暢，延遲越久就可能造成更多腦細胞永久性的傷害，而有殘障失能或死亡的危險。

拯救大腦和時間賽跑

每拖延 1 分鐘，大腦內的腦細胞就會死亡 190 萬個。

檢查腦中風徵狀FAST 跟著口訣做做看

微笑

Face

臉部歪斜
不對稱

舉手

Arm

手臂
無力下垂



說你好

Speech

說話
不清楚



馬上打 119
叫救護車

Time

記錄時間
趕快送醫


有哪個動作怪怪的？
可能中風了！趕快就醫

中風的緊急處理方式 有哪些？

及早治療，減少後遺症


施打靜脈血栓溶解劑

- 缺血性腦中風初發病及早施打 IV rt PA (最好 <3 小時)
- 3 個月後約 4 成有機會完全復原或只有輕微功能缺損，有效降低失能風險
- 減少一半臥床的機會。



執行動脈血栓移除手術

若確認缺血性腦中風是因**特定大血管阻塞**，醫師將可採取動脈血栓移除搶救腦細胞





Reference:

1. Lancet. 2010 May 15;375(9727):1695-703.
2. Front Neurol. 2019 Oct 15;10:1038.



電子檔請掃描
QR CODE