

# 尋寶之旅大小事

\ 試管嬰兒好孕攻略 /



台灣生殖醫學會



中華民國生育醫學會



台灣生殖醫學會



中華民國生育醫學會

TW-MR-2400020

台灣生殖醫學會 中華民國生育醫學會共同編印



## 01 認識生育的起源

1

---

## 02 檢查生育能力

3

---

## 03 生殖醫學的治療方式

5

---

## 04 誘導排卵療程

8

---

## 05 破卵 / 取卵

13

---

## 06 培養 / 植入

15

---

## 07 等待與驗孕

17



試管嬰兒

# 樂孕尋「寶」之旅


要順利懷孕會經過哪些過程呢？

一起踏上試管嬰兒的樂孕尋「寶」之旅吧！



尋寶之旅的事前準備

01 懷孕不就是  
精卵結合嗎？




02 與另一半的  
能力值



03 生殖醫學的  
治療方式



06 培養成胚胎



05 破卵與取卵



04 誘導排卵療程



尋寶之旅的關卡



試管嬰兒  
補助方案

新鮮胚胎  
冷凍胚胎

胚胎植入

07 驗孕



排卵針可能  
的副作用


AMH值  
指  
是什麼？

掌握樂孕的重點！



# 01 認識生育的起源

懷孕難道不就是精卵結合而已嗎？



## 02 檢查生育能力

### 孕前檢查項目

#### 女性

- 內診檢查
- 陰道超音波檢查
- 子宮輸卵管攝影
- 血液荷爾蒙分析（包括AMH數值）
- 子宮鏡檢查
- 基礎體溫及排卵測試測量



#### 男性

- 精液量 / 精蟲數
- 精蟲濃度
- 精蟲活動力
- 前進型精蟲率
- 精蟲存活率
- 正常形態比例

\*上述男性檢查項目透過一次的精液分析可以得知



### 不孕是什麼？為什麼會不孕？



世界衛生組織(WHO)不孕的定義<sup>[1]</sup>：

一對夫妻或情侶在沒有採取任何避孕措施的情形下，經過一年或以上持續規律的性行為≥12個月仍然無法成功懷孕。

① 輸卵管疾病，例如輸卵管阻塞

② 子宮疾病可能是發炎性的（例如子宮內膜異位症）、先天性的（例如中膈子宮）或良性的（例如子宮肌瘤）

③ 卵巢疾病，例如多囊性卵巢症候群和其他卵泡疾病

④ 內分泌系統失調



① 輸精管阻塞或先天性無輸精管導致精液中無精蟲

② 荷爾蒙失調導致腦下垂體、下視丘和睪丸產生的荷爾蒙異常

③ 睪丸無法產生精子

④ 精子功能和品質異常，導致精子形狀（形態）和運動（活力）異常





以上問題恐影響精卵順利結合  
如有不孕跡象，請至生殖醫學專科諮詢治療方式



[1] WHO IVF不孕症介紹 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility>

# 03 生殖醫學的治療方式

不同年齡會影響單次懷孕的成功率  
年紀越大卵子的受精率會下降，  
自然流產率也會提高

	人工授精 ( IUI ) <sup>[2]</sup>	試管嬰兒( IVF ) <sup>[3]</sup>												
單次成功率	 <table border="1"><thead><tr><th>年齡</th><th>成功率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>&lt;30 歲</td><td>13%</td></tr><tr><td>38-41 歲</td><td>7%</td></tr></tbody></table>	年齡	成功率 (%)	<30 歲	13%	38-41 歲	7%	 <table border="1"><thead><tr><th>年齡</th><th>成功率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>&lt;30 歲</td><td>18-29%</td></tr><tr><td>38-41 歲</td><td>10-17%</td></tr></tbody></table>	年齡	成功率 (%)	<30 歲	18-29%	38-41 歲	10-17%
年齡	成功率 (%)													
<30 歲	13%													
38-41 歲	7%													
年齡	成功率 (%)													
<30 歲	18-29%													
38-41 歲	10-17%													
施作方式	以人工將洗滌過的精子注射進子宮腔內協助受精。	將精卵取出體外，培養成胚胎後植入子宮。												
受精方式	體內受精 	體外受精 												
療程費用	約 1.5 ~ 1.8 萬台幣 / 次	依選擇的試管療程不同 試管療程一次約 15-25 萬元起												

[2] Belloc, S., Cohen-Bacrie, P., Benkhaliifa, M., Cohen-Bacrie, M., De Mouzon, J., Hazout, A., & Ménézo, Y. (2008). Effect of maternal and paternal age on pregnancy and miscarriage rates after intrauterine insemination. *Reproductive biomedicine online*, 17(3), 392-397.

[3] 衛生福利部國民健康署110年人工生殖報告書

## 試管嬰兒補助方案



### 資格條件

不孕夫妻至少一方具中華民國國籍且妻年齡未滿 45 歲者

### 補助額度成數

- 低收入戶及中低收入戶：每次補助上限維持 15 萬元。
- 非低收入戶及中低收入戶：首次申請補助者，每次補助上限 10 萬元。再次申請補助者，每次補助上限 6 萬元。

### 試管嬰兒治療補助次數

妻年齡未滿 40 歲：6 次

妻年齡 40-44 歲：3 次

### 不孕症治療胚胎植入數規定

妻未滿 36 歲：最多植入 1 個胚胎。

妻已滿 36 歲且未滿 45 歲：最多植入 2 個胚胎。



衛生福利部國民健康署  
試管嬰兒補助專區


## 如果想嘗試相較人工受孕成功率更高的 試管嬰兒，要經過哪些步驟？




1 誘導排卵療程



2 破卵與取卵



3 體外受精並  
培養成胚胎



4 胚胎移植




5 驗孕



## 04 誘導排卵療程

### 為什麼會需要誘導排卵療程，作用是什麼？

正常女性每月會排出1顆成熟的卵子，其餘未成熟發展的卵泡則會萎縮。



透過誘導排卵療程刺激荷爾蒙，讓多一些卵泡都發育長大為成熟的卵子，方便療程時取出更多卵子。


不過並非取卵數越多就越好，根據個人身體數值會有不同的數量，因此要兼顧數量和品質的平衡，才能更有效率。

#### 正常月經週期



體內女性荷爾蒙提供1到2顆卵子成熟，其他則會自行萎縮。

#### 使用排卵針



排卵針提供足夠的荷爾蒙讓多一些卵子成長後被取出。

## 常見的誘導排卵療程有哪些<sup>[4]</sup>？


注射型排卵藥物主要的成份為濾泡刺激素 (FSH) 及黃體化激素 (LH)，有的藥物含有 FSH 及 LH，有的藥物僅含有 FSH 或 LH。

### 目前注射型排卵藥物的來源可分成三大類




第一類

高純度的尿液製劑



第二類

倉鼠細胞的基因工程製劑



第三類

人類細胞株基因工程製劑

在女性排卵期，透過分泌 FSH 與 LH，當兩種荷爾蒙透過血液到達卵巢時，卵子就會趨向成熟。



[4] Leão, R. B. F., & Esteves, S. C. (2014). Gonadotropin therapy in assisted reproduction: an evolutionary perspective from biotherapeutics to biotech. *Clinics*, 69(4), 279-293.

## AMH在治療中的意義

醫師可藉此數值評估卵子庫存量<sup>[5]</sup>，預測排卵刺激後能取出的卵子數目，進而決定刺激排卵時的療程和劑量。



### 不同年齡對應的 AMH 值(中位數)<sup>[6]</sup>


30歲 以下	2.91 ng/ml
30-34歲	2.42 ng/ml
35-37歲	2.03 ng/ml
38-40歲	1.5 ng/ml
41-42歲	0.92 ng/ml
42歲 以上	0.59 ng/ml

\* AMH值與患者年齡具有關聯性，上表觀察到 AMH 數值與年齡之間存在負相關。如對您自己的AMH值有疑問，建議可與您的主治醫師討論喔！

[5] La Marca, A., Grisendi, V., & Griesinger, G. (2013). How much does AMH really vary in normal women?. *International journal of endocrinology*, 2013(1), 959487.


[6] Maslow, B. S. L., Guarnaccia, M., Hennessy, D., & Klein, J. U. (2019). Age-based interpretation of anti-müllerian hormone (AMH) levels in non-infertile women [37]. *Obstetrics & Gynecology*, 133, 117S-118S.

# 排卵針可能的副作用



## 情緒波動

試管療程用藥引起的荷爾蒙變化可能導致心理壓力、煩躁和情緒波動。



## 腹脹和腹部不適

卵巢刺激藥物可能會導致腹部不適、腹脹和飽腹感。



## 潮熱

有些女性可能會出現類似於更年期症狀的潮熱。



## 注射部位反應

有些人可能會在注射部位感到疼痛、發紅或腫脹。



## 乳房脹痛

荷爾蒙變化會導致乳房脹痛或疼痛。



## 卵巢過度刺激症候群（OHSS）

當卵巢因對卵巢刺激藥物的過度反應而變得腫脹和疼痛時，就會發生這種情況。症狀可能包括腹脹、疼痛和噁心。<sup>[7]</sup>



千萬不要忽略任何的身體不適，以為忍過就能懷孕  
如果有任何不舒服，建議可和主治醫師溝通




# 05 破卵 / 取卵



## 破卵

卵泡發育成熟後，  
下一步就是**破卵關卡**～




## 為什麼要打破卵針? 破卵針治療說明<sup>[8]</sup>

注射排卵針至濾泡成熟後(通常約開始注射後的第十~十二天，依每位病人狀況可能會有所不同)，**取卵者**會施打「**破卵針**」讓卵泡成熟，並等待激素刺激引發排卵。

破完卵後，就進到取卵的小關卡！

## 取卵

放輕鬆～準備好要**取卵了嗎？**



## 取卵說明

因應每個人的卵巢狀況與AMH值會有不同的取卵數，要注意並非取卵數越多就越有機會成功受孕，因為精卵品質也是受精成功非常重要的關鍵！<sup>[9][10]</sup>

取卵完成後，恭喜你完成第一關卡！

[8] 不孕症的診斷與試管嬰兒(IVF)治療流程. 台灣生殖醫學會. <http://www.tsrm.org.tw/tsrm-tft/overseasMedica/>

[9] Broekmans, F. J., Kwee, J., Hendriks, D. J., Mol, B. W., & Lambalk, C. B. (2006). A systematic review of tests predicting ovarian reserve and IVF outcome. *Human reproduction update*, 12(6), 685-718.


[10] Stone, B. A., Alex, A., Werlin, L. B., & Marrs, R. P. (2013). Age thresholds for changes in semen parameters in men. *Fertility and sterility*, 100(4), 952-958.

# 06 培養 / 植入

在經過了重重考驗後，恭喜你們終於晉升一級來到胚胎培養的關卡！

## 胚胎培養<sup>[11]</sup>

將精子與卵子一起進行受精，受精卵放入培養皿中，等待約二~五天發育成胚胎。



### 受精成功小秘訣

精卵品質與胚胎品質，都是成功的關鍵！



新鮮胚胎、冷凍胚胎差在哪？

### 新鮮胚胎

精卵結合的受精卵，透過細胞分裂，成為第二~五天的胚胎時，植入子宮腔內。

### 冷凍胚胎

受精成為胚胎後，以冷凍保護劑處理後，用「冷凍技術」將胚胎保存在體外，待身體狀況合適、時機成熟後解凍再進行胚胎植入於子宮內。




再來就是胚胎植入<sup>[12]</sup>的步驟了！

## 胚胎植入

等待約二~五天發育成胚胎後會進行胚胎植入，胚胎植入後 10-14 天可抽血驗孕（檢驗 hCG 值）。驗孕過關後大約還需要兩週才能安排陰道超音波確認胚胎著床狀況（大小、位置、數量，重點包括排除子宮外孕的風險）

然而胚胎植入成功率的高低，受到各種因素的影響，年齡的增長也是影響成功率的重要因素。



由胎盤合體滋養層細胞分泌，植入的胚胎如果著床，胎盤就會分泌 hCG，因此可以藉由檢測 hCG 值來確定是否有懷孕。<sup>[13]</sup>



植入前後都要保持放鬆、正常作息，保持好心情  
讓身體保持舒適狀態，迎接寶寶到來。

[11] 不孕症的診斷與試管嬰兒(IVF)治療流程. 台灣生殖醫學會. <http://www.tsrm.org.tw/tsrm-tft/overseasMedica/>

[12] 不孕症的診斷與試管嬰兒(IVF)治療流程. 台灣生殖醫學會. <http://www.tsrm.org.tw/tsrm-tft/overseasMedica/>  
[13] Chard, T. (1992). Pregnancy tests: a review. Human reproduction, 7(5), 701-710.

# 07 等待與驗孕

心情起伏、壓力，也會影響懷孕成功率<sup>[14]</sup>

等待驗孕的過程中，寶爸寶媽可以這樣做



放鬆心情



回診驗孕




與主治醫師/治療團隊諮詢



生活如常



適時求助心理諮商



夫妻互相加油打氣




順利懷孕前關卡重重  
大家記得放鬆心情，勇敢的面對每一次的結果！

[14] Olivius, C., Friden, B., Borg, G., & Bergh, C. (2004). Why do couples discontinue in vitro fertilization treatment? A cohort study. *Fertility and sterility*, 81(2), 258-261.

祝福你！  
\\ 下一位迎來寶寶的爸媽就是你們了！ /

### 順利尋寶的重點整理



男性與女性的  
精卵品質




良好的受孕環境



正確的「樂孕」知識



充分與醫師  
溝通與配合



放鬆心情  
以理性去看待



搜尋 「育齡知識投資學」  
了解更多詳情唷！



歡迎掃描  
QR code





一同計畫好孕攻略 / +°

